

SESSION 2014

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

Sujet commun : ENS Ulm – Lyon – Cachan – ENSAE – ENSAI

DURÉE : 4 heures

L'énoncé comporte 4 pages

L'usage de la calculatrice est interdit.

Tournez la page S.V.P.

Les trois exercices qui suivent sont indépendants et peuvent donc être abordés dans un ordre laissé au libre choix du candidat.

Dans l'ensemble du sujet, pour répondre à une question, le candidat pourra admettre les résultats des questions précédentes, du moment qu'il l'aura clairement indiqué.

Il est demandé de soigneusement numéroter les questions. Il sera fait grand cas lors de la correction de la clarté, de la concision et de la précision de la rédaction.

Exercice 1 Pour tout entier $n \geq 2$, on note F_n la matrice à $n + 1$ lignes et $n - 1$ colonnes telle que, pour tout k , la k -ième colonne a tous ses coefficients nuls sauf le k -ième et le $(k + 2)$ -ième qui valent 1. Ainsi

$$F_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad F_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) Déterminer le rang de F_3 dans \mathbb{R}^4 .
- (2) Déterminer pour n quelconque le rang de F_n dans \mathbb{R}^{n+1} .
- (3) Pour tout $n \geq 2$, soit G_n la matrice à $n - 1$ lignes et $n + 1$ colonnes telle que, pour tout $k \in \{1, \dots, n - 1\}$, la k -ième ligne de G_n est nulle sauf le coefficient k qui vaut $(n - k + 1)(n - k)$ et le coefficient $k + 2$ qui vaut $k(k + 1)$. Ainsi

$$G_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad G_3 = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad G_4 = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

$$G_n = \begin{pmatrix} n(n-1) & 0 & 2 & 0 & - & - & 0 \\ 0 & (n-1)(n-2) & 0 & 6 & 0 & - & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & - & 0 & 6 & 0 & (n-1)(n-2) & 0 \\ 0 & - & - & 0 & 2 & 0 & n(n-1) \end{pmatrix}.$$

Déterminer le noyau de G_3 .

- (4) Déterminer, pour n quelconque, la dimension de $\text{Ker}(G_n)$.
- (5) Écrire la matrice $M_n = G_n F_n$. Préciser en particulier le nombre de lignes et de colonnes de M_n .
- (6) Montrer que M_n a même rang qu'une matrice triangulaire supérieure telle que, pour tout k , le k -ième terme diagonal vaut $(n - k + 1)(n - k)(1 - \epsilon_k) + k(k + 1)$, avec, pour tout k , $0 \leq \epsilon_k < 1$. En déduire que M_n est inversible.

Indication : appliquer l'algorithme du pivot de Gauss et procéder par récurrence sur les colonnes.

- (7) Montrer que $\mathbb{R}^{n+1} = \text{Im}(F_n) \oplus \text{Ker}(G_n)$.

Exercice 2 : Théorème de Weierstrass

Dans cette exercice, on considère la fonction suivante :

$$f : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \cos(\pi t)e^{-\pi t} \end{cases} .$$

Préliminaires

- (1) Donner le tableau de variation de la fonction f et représenter son graphe sur l'intervalle $[0, 1]$.
- (2) Montrer que

$$\forall (t, u) \in [0, 1]^2, \quad |f(t) - f(u)| \leq M|t - u| ,$$

pour une constante numérique M que l'on précisera.

- (3) Soit Y est une variable aléatoire positive ne prenant qu'un nombre fini de valeurs, montrer que

$$\forall y > 0, \quad \mathbb{E}[Y] \geq y\mathbb{P}(Y \geq y) .$$

Indication : on pourra écrire $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[Y\mathbf{1}_{Y < y}] + \mathbb{E}[Y\mathbf{1}_{Y \geq y}]$. On rappelle que $\mathbf{1}_{Y < y}$ est la variable aléatoire qui vaut 1 si $Y < y$ et 0 sinon, ainsi, on a toujours $\mathbf{1}_{Y < y} + \mathbf{1}_{Y \geq y} = 1$.

Partie 1

Soit Q_n la fonction définie par

$$Q_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) t^k (1-t)^{n-k} \end{cases} .$$

Soit $p \in [0, 1]$ et X_1, \dots, X_n des variables aléatoires de Bernoulli indépendantes et identiquement distribuées (iid) de loi $\mathcal{B}(p)$.

- (4) Donner la loi de $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Donner son espérance et sa variance.
- (5) On note $\bar{X}_n = \frac{S_n}{n}$, montrer que

$$\text{Var}(\bar{X}_n) \leq \frac{1}{4n} .$$

- (6) Montrer que

$$\mathbb{E}[f(\bar{X}_n)] = Q_n(p) .$$

- (7) Montrer que

$$Q_n(p) - f(p) = \sum_{k=0}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(p) \right) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} .$$

Partie 2

Soit $\epsilon > 0$, on note A_1 l'ensemble des entiers $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ tels que $|p - k/n| < \epsilon/M$ et A_2 l'ensemble des entiers $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ tels que $|p - k/n| \geq \epsilon/M$. On a donc $Q_n(p) - f(p) = S_1 + S_2$, où

$$\forall i \in \{1, 2\}, \quad S_i = \sum_{k \in A_i} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(p) \right) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} .$$

(8) Montrer que, pour tout $k \in A_1$, $|f(k/n) - f(p)| \leq \epsilon$, en déduire que $|S_1| \leq \epsilon$.

(9) Montrer que $|S_2| \leq M \mathbb{P}(|\bar{X}_n - p| \geq \epsilon/M)$.

(10) Montrer que

$$\forall p \in [0, 1], \quad \lim_{n \rightarrow \infty} Q_n(p) = f(p) .$$

(11) Montrer que

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - p| \geq \epsilon/M) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{(\epsilon/M)^2} .$$

(12) Montrer que

$$\forall p \in [0, 1], \quad |Q_n(p) - f(p)| \leq C \left(\frac{M^2}{n}\right)^{1/3} ,$$

pour une constante numérique C que l'on précisera.

(13) Le théorème de Weierstrass affirme que, pour toute fonction g continue sur $[0, 1]$, il existe une suite $(P_n)_{n \geq 1}$ de polynômes telle que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |g(x) - P_n(x)| = 0 .$$

Montrer que le théorème de Weierstrass est vérifié dans le cas où g est la fonction f .

(14) Démontrer le théorème de Weierstrass dans le cas où g est une fonction de classe \mathcal{C}^1 quelconque.

Exercice 3

Dans cet exercice, $\alpha \in]0, \infty[\setminus \mathbb{N}$ désigne un nombre réel positif non-entier et f est la fonction

$$f : \begin{cases}]0, \infty[& \rightarrow &]0, \infty[\\ x & \mapsto & x^\alpha \end{cases} .$$

- (1) Montrer que f est une fonction infiniment dérivable sur $]0, \infty[$.
- (2) Donner, pour tout $k \in \mathbb{N}$, une expression de la dérivée k -ième de f , $f^{(k)}$.
- (3) On définit la fonction

$$f_1 : \begin{cases}]0, +\infty[& \rightarrow &]0, +\infty[\\ x & \mapsto & f(x+1) - f(x) \end{cases} .$$

Montrer que, pour tout $x > 0$, il existe $x_1 \in [x, x+1]$ tel que $f_1(x) = f'(x_1)$.

- (4) Pour toute fonction g définie sur $]0, \infty[$ et infiniment dérivable sur cet intervalle, on définit récursivement les fonctions $(g_k)_{k \geq 0}$ sur $]0, \infty[$ comme suit

$$\begin{aligned} g_0(x) &= g(x), \\ g_{k+1}(x) &= g_k(x+1) - g_k(x). \end{aligned}$$

- (a) Montrer que, pour tout entier k , la dérivée de g_k est égale à $(g')_k$.
Indication : on pourra utiliser une récurrence.
- (b) On note $g^{(k)}$ la dérivée k -ième de g . Montrer que, pour tout $k \geq 1$, pour toute fonction g et tout réel $x > 0$, il existe $x_k \in [x, x+k]$ tel que

$$g_k(x) = g^{(k)}(x_k).$$

- (5) On suppose dans cette question que n^α est un entier pour tout n .
 - (a) Soit k l'entier tel que $\alpha \in]k-1, k[$. Montrer que, pour tout entier n ,

$$f_k(n) > 0 \quad \text{et} \quad f_{k+1}(n) < 0 .$$

- (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f_k(n)$ est un entier.
- (c) Montrer que u_n est une suite strictement décroissante d'entiers naturels.
- (d) Soit $\beta \geq 0$ un réel. Montrer que $\beta \in \mathbb{N}$ si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^\beta \in \mathbb{N}$.

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

Sujet commun : ENS Ulm – Lyon – Cachan – ENSAE – ENSAI

DURÉE : 4 heures

L'usage de la calculatrice est interdit.

ERRATUM

Merci de bien vouloir faire connaître aux candidats les modifications suivantes

- Exercice 2 ne pas faire la Question (3).
- Exercice 2, Question (11), rajouter *Indication: on admettra que, pour toute variable aléatoire Y admettant une variance,*

$$\forall y > 0, \quad \mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}[Y]| > y) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{y^2} .$$

- Exercice 2, Question (12), dans l'équation à droite du signe \leq il faut remplacer

$$C \left(\frac{M^2}{n} \right)^{1/3} \text{ par } C \frac{M}{n^{1/3}}$$